

Kahverengi Kokarca (<i>Halyomorpha halys</i>) Geçici BKÜ Tavsiye Listesi							
	Bitki	Aktif Madde	Formulasyon	Doz	Maksimum Kalıntı Limiti MRL(mg/kg)	Son ilaçlama ile hasat aşında geçmesi gereken süre (PHI) (gün)	Geçici BKÜ geçerlilik süresi Ek-1
Zararlı Organizma <i>Halyomorpha halys</i> (Kahverengi kokarca)	Şeftali	20 g/l Lambda-cyhalothrin	CS	90 ml/da	0,15	14 gün	15 Mayıs -15 Eylül
		200 g/l Chlorantraniliprole	SC	20 ml / 100 l su	1,00	14 gün	
	Armut	25 g/l Deltamethrin	EC	50 ml/100 L. su	0,09	3 gün	15 Haziran-15 Ekim
		250 g/l Cypermethrin	EC	20 ml / 100 l su	1,00	7 gün	
	Kivi	20 g/l Pyrethrin	EC	200 ml/100 L su	1,00	7 gün	15 Haziran-15 Ekim
		20 g/l Lambda-cyhalothrin	CS	90 ml/da	0,05	21 gün	
	Trabzon hurması	20 g/l Pyrethrin	EC	200 ml/100 L su	1,00	7 gün	15 Haziran-15 Ekim
		20 g/l Lambda-cyhalothrin	CS	90 ml/da	0,09	14 gün	
		10 g/l Azadirachtin A	EC	300 ml/100 L su	0,5	7 gün	
	Turunçgil	%50 Pirimicarb	WP	30 g / 100 l su	3,00	21 gün	15 Mayıs -15 Eylül
	Elma	20 g/l Lambda-cyhalothrin	CS	90 ml/100 L su	0,08	21 gün	15 Haziran-15 Ekim
		25 g/l Deltamethrin	EC	50 ml/100 L. su	0,2	3 gün	
	Ceviz	25 g/l Deltamethrin	EC	50 ml/100 L. su	0,01	3 gün	15 Haziran-15 Ekim
		218 g/l Acetamiprid + 37 g/l Eamectin Benzoate	DC	50 ml/100 L su	0.07-0,02	14 gün	
	İncir	20 g/l Pyrethrin	EC	200 ml/100 L su	1,00	7 gün	15 Mayıs -15 Eylül
		0,3 g/l Azadirachtin + 0,5 g/l Pyrethrin	OD	250 ml/100 L su	1-1	7 gün	
	Aronya	20 g/l Pyrethrin	EC	200 ml/100 L su	1	7 gün	1 Haziran -1 Ekim
		10 g/l Azadirachtin A	EC	300 ml/100 L su	1	7 gün	
	Yaban mersini	20 g/l Pyrethrin	EC	200 ml/100 L su	1	7 gün	15 Mayıs -15 Eylül
		10 g/l Azadirachtin A	EC	300 ml/100 L su	1	7 gün	
	Çilek	10 g/l Azadirachtin A	EC	300 ml/100 L su	1	3 gün	15 Mayıs -15 Eylül
		240 g/l Spinosad	SC	40 ml / da	0,3	3 gün	

¹ Kahverengi kokarcanın ilgili konukçuda yoğun olarak bulunduğu zaman dilimi esas alınmıştır.

Kahverengi kokarcanın kışlaklardan çıktığı dönem ile kışlaklara toplandığı dönem arasında (ağustos ayı başı- kasım ayı sonu) konukçu bitkilerde mücadeleye yönelik gözlemler yapılmalı ve gerektiğinde insektisit kullanılmasına karar verilmelidir. Mayıs ayında kışlaklardan çıkış hızlanmakta, mayıs ayının ortasından sonra ise riskli dönem başlamaktadır. Özellikle yumurta bırakmanın zirve yaptığı temmuz ayının ortasından sonra konukçu bitkilerdeki popülasyon artışı öncesinde koruyucu kimyasal uygulamalar yapılmalıdır. Kahverengi kokarca popülasyonu/varlığı, bitkilerin fenolojik durumlarına göre değişkenlik gösterdiğinden ilaçlamaya bahçelerde örnekleme yapılarak karar verilmelidir.

Buna göre meyvelerde (Kivi hariç);

- 1-10 da bahçelerde 10 ağaç veya omca
- 11-20 da bahçelerde 20 ağaç veya omca
- 21 da'dan büyük bahçelerde 30 ağaç veya omca üzerinden yapılmalıdır.

Ağaçlar darbe metoduyla örneklenir. 10 ağaçta, ağacın farklı yönlerinden toplam 100 darbede toplam 10 nimf veya 10 ergin görüldüğünde veya 10 ağaçta yapılan gözle incelemede ağaç başına 1 nimf veya ergin görülmesi durumunda ilaçlama önerilir.

Kivi bahçelerinde örnekleme;

- 1 - 10 dekar büyüklüğündeki bahçelerde 10 omca,
- 11-20 dekar büyüklüğündeki bahçelerde 20 omca,
- 20 dekardan büyük bahçelerde 30 omca üzerinden yapılmalıdır.

Diğer meyvelerden farklı olarak kivide gözle inceleme yöntemiyle örnekleme yapılmalıdır. Gözle incelemede bitkilerin meyve, yaprak, sürgün ve dalları kontrol edilmelidir. Örneklemede 10 omcada 10 nimf veya 10 ergin görüldüğünde ilaçlama önerilir.
