

| Bitki ve Etmen Adı                                                              | Önerilen Aktif Madde Adı ve Oranı                                                                                               | Form.Şekli | Uygulama Dozu                            | MRL (mg/kg) | Uygulama zamanı, şekli sayısı                                                                                                                                                                                              | Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre (PHI) (gün) | Uygulama Aralığı (Başlangıç tarihi – Bitiş tarihi) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Trabzon Hurması-</b><br>Akdeniz meyvesineği<br>( <i>Ceratitis capitata</i> ) | 7,8 g Amonyum Asetat + 0,737 g Trimetilamin Hidroklorid + 0,034 g Kadaverin / Huni Tipi Tuzak                                   | -          | 7 adet tuzak /da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -           | Monitör tuzaklarda erginlerin yakalanmaya başladığı ve meyvelerde renk değişiminin başladığı dönemden en az 1 ay önce, kitle yakalama tuzakları ağaçların güney, güney doğu yönüne, yerden 1.5–2 m yüksekliğe asılmalıdır. | -                                                                | 01.08.2025-30.11.2025                              |
|                                                                                 | 7,8 g Amonyum asetat + 1,04 g Trimethylamine hydrochloride + 0,034 g Kadaverin (1,5-diaminopentane)+0,015 g Deltamethrin+ Tuzak | -          | 8 adet tuzak /da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -           | Zararlı yoğunluğunun çok yüksek olduğu durumlarda ‘kısmi dal ilaçlama yöntemi’ ile ilaçlama yapılarak kombine edilmelidir.                                                                                                 | -                                                                |                                                    |
|                                                                                 | 0,0075 g Lambda cyhalothrin +%74,75 Ammonium acetate+%8,31 Trimethylamine hydrochloride+%0,33 1,4Diaminobutane+Tuzak            | -          | 8 adet tuzak /da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -           |                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                |                                                    |
|                                                                                 | 0,015 g Deltamethrin + 7,8 g Ammonium acetate + 0,5 g Chlorohydrate trimethylamine + 0,03 g 1.5-Diaminopentane/ Tuzak           | -          | 8 adet tuzak /da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -           |                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                |                                                    |

|  |                              |    |                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|--|------------------------------|----|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  | 59,4 g/l Hidrolize Protein   | -  | 10 adet tuzak/da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -   |                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |                       |
|  | 72 g/l Hidrolize Protein     | -  | 10 adet tuzak/da (Kitle Yakalama Amaçlı) | -   |                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |                       |
|  | 100 g/ L<br>Cyantraniliprole | SE | 50 ml+200 ml Nu-Lure/10 L su             | 0,8 | -Meyvelerin normal iriliğine ulaşp renk değişiminin başladığı dönemde ‘kısmi dal ilaçlama yöntemi’ ile uygulanır. -İlaçlamayı takiben tuzaklarda ergin görülmesi durumunda uygulanan ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlamalar tekrarlanır. | 14 gün | 01.09.2025-30.11.2025 |