

TRİTİKALE TARIMI

Erozyon nedeniyle sığlaşan, verim gücünü yitiren yüksek kesimlerdeki topraklarda, buğdayın iki katı bir verim potansiyeline sahiptir. Başka ülkelerde yoğun olarak yetiştirilebilmektedir.

Tritikale buğday ile çavdar melezlemesi sonucu oluşmuştur. Bunda amaç, çavdarın kötü koşullara dayanıklılığı ile buğdayın verim potansiyeli ve kalitesini birleştirmektir. Hayvan yemi olarak değerlendirilebildiği gibi son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları sonucu dane kalitesindeki iyileşme sonucu değirmencilikte paçalda kullanılmaktadır. Ayrıca kuru ot verimi yüksek olup, daha uzun süre saklanabilmekte ve süt sığırlarına silaj olarak yedirilebilmektedir.

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

Tritikale, kuru tarım alanlarına uyumu iyi olup, yüksek, yağışlı veya bir kere sulanabilen alanlarda yüksek verim verir. Özellikle kuzey geçit, batı geçit ve toros bölgesine uyumu iyidir. Soğuk ve kurak şartlara dayanıklılığı fazladır. Toprak bakımından fazla seçici olmayıp çavdarın yetiştirdiği toprak şartlarında yetiştirilebilir.

TARLA HAZIRLIĞI

Nadas uygulanan alanlarda tritikale yetiştirilecekse, toprağı devirmedin işleyen makinelerle sürüm yapılmalı ve toprak işlemeye ilkbaharda başlanmalıdır. Sulu tarım alanlarında ise toprak derin işlenmeli ve ürün kaldırıldıktan hemen sonra gölge tavında iken sürülmelidir. İlk sürümden sonra tarlanın yabancı ot durumuna göre yüzlek sürüm yapılmalıdır.

GÜBRELEME

Kuru tarım alanlarında ekim sırasında dekara 6-7 kg fosfor ve 2-3 kg azot (15 DAP), sulu tarım alanlarında ise dekara 8-9 kg fosfor ve 3-4 kg azot (20 kg DAP) tavsiye edilir. Toplam saf azot miktarı bahar mevsiminde dekara kuruda 6-7 kg, suluda ise 9 kg 'a tamamlanmalıdır. Bu amaçla kuruda erken dönemde (Şubat-Mart) Dekara 20 kg amonyum sülfat (% 21 N), suluda 25 kg amonyum sülfat (%21 N) gübresi kullanılabilir.

EKİM

Bölgemizde tritikale için en uygun ekim zamanı Ekim ayı olup, en ideal ekim metodu mibzerle ekimdir. Ekim derinliği kışlık ekimlerde 5-6 cm., yazlık ekimlerde ise 3-4 cm. dir. Atılacak tohum miktarı mibzerle ekimde 22-25 kg/da olmalıdır. Eğer serpme ekim yapılacaksa bu miktar 2-3 kg arttırılmalıdır. Ekim öncesi sistemik tohum ilaçları ile tohum ilaçlanmalıdır.

BAKIM

Tritikale tarlasında gerekli görüldüğünde yabancı otları yok etmek için bitkinin sapa kalkma döneminde herbisitler (yabancı ot öldürücüleri) kullanılmalıdır. Tritikale su istemeyen bir bitkidir, ancak suyun bitki gelişimini sınırladığı sapa kalkma

döneminde sulanması verimi arttırmaktadır. Fazla sulama yatma problemlerine sebep olabilir.

HASAT

Tritikale biçerdöverle hasat edilecekse avuç içinde oğlan başaktaki daneler kolayca ayrılıyorsa hasat edilmelidir. Ancak hasat tırpan, orak, veya biçme makineleri ile yapılacaksa biraz daha erken hasat edilebilir. Dane dökme problemi olmadığı için hasat kaybı düşüktür. Dekara verimi 300-400 kg'dır.

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN!!!